



Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby- rzekomego pomoru drobiu (ND) w miejscowości Wielgie, gm. Zbójno, w powiecie golubsko dobrzyńskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że ukazało się Rozporządzenie Nr 5/2026 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lutego 2026 roku w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu(ND) na terenie powiatów golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego, rypińskiego i **toruńskiego**, na mocy którego:

miejscowość Liciszewy położona w gminie Czernikowo, powiat toruński

została uznana za obszar zapowietrzony rzekomym pomorem drobiu

natomiast miejscowości: Jackowo, Kijaszkowo, Mazowsze, Mazowsze Parcele, Steklin, Steklinek, Szkleniec, Ograszka, Kijaszkówiec; położone w gminie Czernikowo, powiat toruński

zostały uznane za obszar zagrożony rzekomym pomorem drobiu

Na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym rzekomym pomorem drobiu, nakazuje się:

- 1) utrzymywanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt; w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach;
- 2) niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produktywności utrzymywanego drobiu;
- 3) zastosowanie odpowiednich przeciwwirusowych środków dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach oraz wjazdach i wyjazdach z gospodarstw;
- 4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji (stosowanie odzieży ochronnej, środków dezynfekcyjnych) w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się rzekomego pomoru drobiu (ND) poprzez:



a) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem rzekomego pomoru drobiu,

b) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się rzekomego pomoru drobiu;

5) prowadzenie ewidencji:

a) wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Toruniu na jego wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2,

b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002

Na obszarze zagrożonym rzekomym pomorem drobiu, zakazuje się:

1) przemieszczania ptaków z i do miejsc utrzymywania;

2) odnowy populacji ptaków łownych

3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

4) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z gospodarstwa;

5) przemieszczania z gospodarstw produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od lub z ptaków utrzymywanych, z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał.

Rzekomy pomór drobiu jest wirusową chorobą zakaźną i zaraźliwą ptaków

Wrażliwy na wirusa jest drób domowy: kury, indyki, bażanty, kuropatwy, przepiórki, kaczki, gęsi, gołębie, ptaki bezgrzebieniowe, ptaki ozdobne (chowane w zamknięciu), dzikie wolnożyjące w tym ptactwo wodne.

U ludzi wirus u ludzi może wywoływać zapalenie spojówek, ogólną infekcję.



Wirus rzekomego pomoru drobiu wykazuje dużą oporność na temperaturę, wilgoć, gnicie i wysychanie.

Źródłem zakażenia są bezpośrednio chore i padłe ptaki, pośrednio zakażona pasza, woda, ściółka, sprzęt, cząsteczki pyłu, człowiek.

Objawy kliniczne

osłabienie, apatia, duszność, obrzęk spojówek i głowy, biegunka o zielonkawym zabarwieniu odchodów, u części ptaków zaburzenia nerwowe (drżenie mięśni, porażenie skrzydeł i nóg, skręty szyi i głowy), u niosek gwałtowny spadek nieśności, jaja odbarwione, bez skorup, śmiertelność do 100%.

Praktyczne zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu – chów przyzagrodowy :

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonym terenie pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,
- odizolowanie od innego drobiu kaczek i gęsi,
- przechowywanie paszy, zielonki w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z ptactwem dzikim,
- zakaz pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodząca z poza gospodarstwa np. zbiorników wodnych, rzek,
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,
- osoby utrzymujące drób przyzagrodowy, aby nie były zatrudniane na fermach komercyjnych,

Zalecenia dla hodowców gołębi:

- Karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich ,
- Przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

Mając świadomość wysokiego ryzyka wystąpienia kolejnych zakażeń w Polsce należy dołożyć wszelkich starań celem zminimalizowania tego zagrożenia rozprzestrzenienia się choroby.

Informację powyższą przesyła się celem udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Toruniu
Violetta Hermann-Krupińska



