

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że w dniu 12.03.2026 r. w lasach na terenie Rozgark gm. Zławieś Wielka, został potwierdzony przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1.

Dodatni wynik stwierdzono u myszola zwyczajnego.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego. Może stanowić również zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych badań wynika, iż człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, jednak może ono wystąpić w przypadku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków higienicznych.

Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

W związku z pojawieniem się przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, podtypu H5N1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu apeluje o ograniczenie przebywania na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, o niedotykanie zwłok i natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu pod numerem telefonu – 56 6553030

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

- Znaczna liczba nagłych padnięć
- Gwałtowny spadek / utrata produkcji jaj
- Miękkie skorupy jaj
- Objawy nerwowe
- Zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek
- Silne łzawienie
- Obrzęk zatok podoczołowych
- Kichanie
- Dusznosc
- Biegunka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu poleca hodowcom prowadzącym chów przyzagrodowy drobiu bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 768), a w szczególności:

- Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.
- Przetrzykiwanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem.
- Przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
- Unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa.
- Zgłaszanie lekarzom weterynarii, zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych upadków drobiu.
- Po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem.
- Wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu.

Wirus ginie w temperaturze 70 °C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w 22 °C i ponad 30 dni w 0 °C.

Środki zapobiegawcze stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia pobrania próbek do badań laboratoryjnych od dzikich ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Toruniu
Violetta Hermann-Krupińska